



## Pompes à gel intestinal



édition mai 22

## Le traitement par pompe à gel intestinal

L'administration continue de L-Dopa directement dans l'intestin grêle permet de traiter efficacement les fluctuations. Cette thérapie est une monothérapie et s'adresse aux personnes dans certaines conditions. Depuis mai 2022, il existe deux pompes à gel intestinal.


### Mécanisme d'action

La L-Dopa (lévodopa) a été introduite dans le traitement antiparkinsonien au milieu des années 1970. Précurseur biochimique de la dopamine, la L-Dopa peut franchir la barrière hémato-encéphalique et, une fois arrivée dans le cerveau, être transformée en dopamine par l'organisme de manière naturelle. Cependant, comme la L-Dopa est déjà dégradée en périphérie (dans l'intestin et dans le sang), sur le chemin du cerveau, par l'enzyme dopadécarboxylase, elle est idéalement administrée en combinaison avec un inhibiteur de la décarboxylase, ce qui permet de maintenir la dose de L-Dopa au niveau le plus faible possible et de limiter ses effets secondaires.

Il existe 2 gels aux compositions différentes :

1. Le « levodopa carbidopa » repris dans le Duodopa (2007)
2. Le « levodopa carbidopa entacapone » repris dans le Lecigimon (2022)

**Duodopa** est une préparation combinée à base de L-Dopa et de cet inhibiteur sous forme de gel visqueux, qui a été produite pour la première fois en 1991. Ce gel dans une cassette en plastique est administré en continu, directement dans l'intestin-grêle, à travers la paroi abdominale et l'estomac par une sonde alimentée par une pompe électronique portée prêt du corps dans une pochette. La substance active peut être absorbée dans le sang de manière optimale. Grâce au débit réglé de manière optimale et personnalisée, les fluctuations sont lissées. Le traitement par la lévodopa augmente la quantité de dopamine dans le cerveau et réduit ainsi les symptômes de la maladie. Le monohydrate de carbidopa est ajouté pour améliorer l'efficacité et réduire les effets indésirables de la lévodopa. Le traitement Duodopa est disponible en Belgique depuis 2007.





## Pompes à gel intestinal



édition mai 22



Lecigimon

**Lecigimon**, disponible en Belgique depuis 2022 est également un gel diffusé en continu par une pompe. Il contient en plus de l'entacapone. L'Entacapone est un inhibiteur spécifique et réversible qui va agir en périphérie. En freinant l'activité des enzymes COMT qui participent normalement à la dégradation de la lévodopa dans le corps, l'entacapone exerce une action qui permet à une plus grande quantité de lévodopa d'atteindre le cerveau. Il s'ensuit une diminution

des fluctuations des symptômes de la maladie de Parkinson qui pourraient survenir en fin de dose du médicament dont «l'action s'épuise» et auxquelles quelques personnes prenant la lévodopa sont susceptibles. L'ajout d'Entacapone permet donc de diminuer la dose journalière de Lévodopa.

Grâce à l'administration continue d'une petite dose du médicament pendant la journée, ces dispositifs peuvent vous aider à maintenir une quantité constante de médicament dans le sang et à réduire ainsi l'incidence d'effets moteurs indésirables.

Le traitement comprend la mise en place chirurgicale d'une sonde au travers de l'abdomen, qui rejoint le petit intestin. Cette sonde est ensuite raccordée à une pompe portée pendant la journée, et qui administre directement la médication dans votre petit intestin. En règle générale, une dose matinale s'administre afin d'atteindre rapidement la quantité adéquate dans votre sang. Ensuite, une dose continue est administrée automatiquement tout au long de la journée. La pompe se débranche en général pour la nuit.

### **Pourquoi envisager une nouvelle manière de gérer les symptômes Parkinson ?**

La personne ayant atteint un stade où elle connaît des épisodes imprévisibles où les médicaments oraux ne suffisent plus peut envisager la question. La personne est gênée par des périodes de fluctuations de sa mobilité, passant de « On » à une soudaine incapacité à bouger « off », avec des mouvements involontaires ou non contrôlés, connus sous le nom de dyskinésies, qui sont de nature à altérer la qualité de vie.

### **Avantages des thérapies par pompe**

Ce traitement chez les personnes souffrant d'un syndrome avancé présente des avantages par rapport au traitement par voie orale :

- Monothérapie : Le traitement par perfusion est généralement utilisé sans administration d'autres médicaments
- Les périodes de bonne efficacité et de moindres dyskinésies pendant les phases « on » sont prolongées.
- Les dyskinésies sont améliorées.
- Dans de nombreux cas, les troubles de la marche s'améliorent nettement.
- L'apparition de freezing est réduite et le risque de chutes baisse.



**Action Parkinson asbl** Siège social Avenue des Klauwaerts 38 1050 Bruxelles

Activités c/o Chaussée de Vleurgat 109 1050 Bruxelles

www.actionparkinson.be - info@actionparkinson.be – 0494 53 10 46

BE90 0689 3269 4332- Don : BE66 0689 3507 1943 - RPM Bruxelles : 0717.582.838



# Pompes à gel intestinal



édition mai 22

- Les problèmes induits par un manque de rigueur du suivi thérapeutique, c'est-à-dire des prises de médicaments à heures précises, disparaissent.
- La plupart du temps, les symptômes psychologiques s'améliorent considérablement ainsi que les troubles du sommeil.
- Ce traitement peut être envisagé pour des personnes qui ont plus de 70 ans, alors que la chirurgie (stimulation cérébrale profonde) leur est rarement recommandée.

### Contre-indications

Comme pour tous les médicaments, il existe certaines contre-indications qui s'opposent au traitement par Duodopa ou requièrent la plus grande prudence. Les principales d'entre elles sont :

- Maladies psychiques graves et/ou troubles dépressifs graves.
- Peu ou absence de réponse à la L-Dopa
- Parkinsonisme atypique ou secondaire
- Mauvais état fonctionnel en phase « on »
- Allergie à un composant du gel
- Glaucome à angle fermé
- Atteinte grave de la fonction hépatique ou rénale
- Insuffisance cardiaque grave et/ou troubles du rythme cardiaque
- Contre-indication chirurgicale

### Complications possibles

Les complications possibles entraînent rarement une interruption du traitement.

- Complication chirurgicale pendant l'intervention pour poser la sonde
- De légères nausées et une perte d'appétit sont fréquents, notamment au début du traitement
- Un laps de temps est nécessaire pour trouver la posologie optimale.
- Inflammation de la paroi abdominale dans la zone du site d'insertion de la sonde, qui peut persister : peau rouge, écoulement, douleurs et irritation, épaissement de la cicatrice à l'endroit où le tube passe.
- Des problèmes techniques comme un glissement de la sonde dans l'estomac, une obstruction du cathéter, une panne de pompe, des points de pliure dans les tuyaux.
- De la difficulté à assumer l'entretien du système. C'est pourquoi, outre des contrôles réguliers par un personnel spécialisé bien formé, une information des proches soignants est indispensable pour le succès à long terme du traitement.

### Critères de remboursement INAMI en Belgique

- Patient qui n'entre pas en ligne de compte pour un traitement par DBS
- Diagnostic de Parkinson idiopathique (> 5 ans)
- Réponse à la lévodopa avérée (>50%)
- Présence de complications motrices induites par lévodopa (fluctuations motrices/non motrices et/ou dyskinésies)



# Pompes à gel intestinal



édition mai 22

- Persistance d'une invalidité à certains moments de la journée, malgré les stratégies thérapeutiques reconnues (stade 4 ou 5 sur l'échelle de Hoehn et Yahr).
- Cognition normale ou déficit cognitif léger (MMS>24) et absence de traitement pour la démence
- Absence de pathologie psychiatrique grave.

### **Initialisation du traitement par pompe**

Avant de passer à la procédure chirurgicale, il convient d'évaluer les effets du traitement avec le placement d'une sonde temporaire dans l'intestin au départ du nez. Ceci se fait durant une hospitalisation de quelques jours. Cette évaluation demande l'arrêt de tout traitement antiparkinsonien avant l'hospitalisation ainsi que quelques examens cliniques préalables.

- **Une phase de test est prérequis.**

Un séjour de quelques jours en hôpital est nécessaire pour évaluer la réponse au traitement. Après sevrage de sa thérapie, c'est-à-dire l'interruption des médicaments antiparkinsoniens administrés jusqu'alors, le patient candidat est équipé d'une sonde nasale temporaire. Une sonde nasale est introduite par une narine dans le pharynx et le long de l'œsophage jusqu'au jéjunum, puis fixée en dessous du nez à l'aide d'un pansement adhésif. Par cette sonde, le gel peut être administré dans l'intestin grêle, à l'endroit où la préparation agit également après le pose de sonde définitive, pendant une phase de test de quelques jours. Ainsi il est possible de contrôler et garantir que le traitement par pompe offre véritablement les avantages escomptés au patient. Le patient sera filmé avant et après pour démontrer la réponse positive au traitement. Pendant cette phase de test, un compte rendu des mouvements est documenté en permanence. A l'aide des observations, la posologie optimale peut généralement être déterminée en quelques jours. La rapidité à laquelle l'effet optimal se produit dépend aussi du traitement précédent.

- **Si l'évaluation est positive, quelle est la prochaine phase ?**

Alors le médecin rédigera un dossier de demande de remboursement. Le dossier passera devant le médecin-conseil de la mutuelle. Cette étape peut prendre du temps. Dès approbation du dossier, le médecin s'organisera pour le placement de la sonde permanente et le démarrage du traitement durant une hospitalisation de quelques jours.

La sonde définitive est posée dans le jéjunum à travers la paroi abdominale et l'estomac dans le cadre d'une brève intervention chirurgicale sous anesthésie générale. Les médecins décident du site d'accès au cas par cas. La sonde ne doit naturellement pas gêner le patient quand il est assis. De plus, il ne doit pas se trouver directement dans un pli graisseux, car cela complique les soins et accroît le risque de complications. Pour choisir correctement le site d'insertion de la sonde, il faut tenir compte du fait qu'une fois traités par pompe Duodopa, les patients redeviennent très actifs grâce à un meilleur contrôle des symptômes. Par conséquent, les convenances personnelles des patients en matière





# Pompes à gel intestinal



édition mai 22

d'esthétique, quant à la douche, la sexualité, aux soins de la peau, aux vêtements et à l'exercice doivent être prises en compte dans la mesure du possible.

Généralement, la plaie guérit sans complications en l'espace de 7 à 10 jours. Durant cette période, de légères douleurs abdominales, de rougeurs locales et une sécrétion de suc gastrique peuvent se produire dans certains cas. Au bout de deux semaines environ, les patients peuvent de nouveau se doucher et même prendre un bain. Dès que la plaie est cicatrisée et que la posologie optimale a été déterminée par le service de neurologie, le patient peut rentrer chez lui. Pendant les premières semaines, il est accompagné et conseillé par un professionnel spécialement formé. Il vérifie le traitement au quotidien et conseille le patient et son entourage en cas de questions et contribue au succès thérapeutique à long terme.

### • Que se passe-t-il au retour à domicile ?

Le patient ainsi que son entourage ont appris à l'hôpital comment utiliser le matériel.

Avant de rentrer au domicile, la personne reçoit une information complète et des contacts utiles. Une fois à domicile, le patient continue à brancher sa pompe tous les matins à une nouvelle recharge qui sera débranchée et jetée tous les jours, même si elle n'est pas vide. La personne sera suivie régulièrement par son médecin, l'infirmière spécialisée et d'autres membres de l'équipe pluridisciplinaire.



### • Après combien de temps les effets se manifestent-ils ?

Les effets thérapeutiques sur les fluctuations motrices et les dyskinésies invalidantes s'obtiennent souvent au cours de la première journée de traitement, donc les effets s'obtiennent déjà au cours de la phase d'évaluation.

## Monothérapie

Le traitement est généralement administré pendant la période où le patient est éveillé, pendant la phase de veille. Si médicalement c'est justifié, le traitement peut être administré jusqu'à 24h. La plupart du temps, la perfusion est utilisée en monothérapie.

*La dose matinale en bolus* est administrée avec la pompe de manière à atteindre rapidement (dans un délai de 10 à 30 minutes) le niveau de dose thérapeutique. La dose doit être calculée sur la base de la dose matinale précédente de lévodopa à laquelle s'ajoute le volume de remplissage de la sonde. La dose matinale totale est généralement comprise entre 5 et 10 ml, ce qui correspond à 100 - 200 mg de lévodopa. La dose matinale totale ne doit pas dépasser 15 ml (300 mg de lévodopa).

La dose d'entretien peut être ajustée par paliers de 2 mg/heure (0,1 ml par heure). Cette dose doit être calculée en fonction de la prise quotidienne antérieure de lévodopa par le patient. En cas d'arrêt des traitements associés, la dose devra être adaptée. La dose d'entretien continue est ajustée individuellement. Si nécessaire, par exemple, en cas de douleurs ou d'immobilité nocturnes,





# Pompes à gel intestinal



édition mai 22

l'application peut être prolongée jusqu'à 24h à plus faible dose . Dans de tels cas, la recharge doit être changée dans le courant de la journée.

En cas de blocage ou débranchage (baignade), des doses supplémentaires peuvent être administrées sur simple pression du bouton + (4 ou 5 doses permises/jour) pour améliorer rapidement la situation. Le soir, avant d'aller se coucher, la pompe est éteinte. Les tuyaux doivent être rincés tous les soirs après le retrait de la pompe, notamment avec une seringue.

### Nettoyage et soins de la peau

La peau autour du site d'insertion (de la stomie) sera nettoyée l'eau et au savon, puis être au sec en permanence. Il convient de renoncer aux pommades et aux crèmes à moins qu'elles n'aient été explicitement prescrites par le médecin traitant. Une compresse sera placée sur la stomie avec la collerette externe fixée à 5-10 mm pour sécuriser la sonde. En cas d'infection, il convient d'en informer le médecin traitant et de renoncer aux remèdes tels que la Bétadine ou alcools chirurgicaux afin d'éviter toute détérioration de la sonde.

### Quels sont les accessoires de ce système ?

- Pompe avec piles
- Recharges:
  - Chacune des cassettes de Duodopa en plastique dur contient un sachet en PVC de 100ml de gel (2000 mg levodopa et 500 mg carbidopa).
  - Pour le Lecigimon il s'agit de cartouches contenant 47ml de gel (940mg levodopa, 940mg entacapone et 235mg carbidopa). Pour rappel l'ajout d'entacapone réduit la consommation journalière de Levodopa, donc une cartouche plus petite est suffisante.
- Tube PEG



Les cassettes non ouvertes se conservent 15 semaines; une fois ouvertes leur usage sera immédiat. Leur stockage se fera au frigo, dans son carton pour rester protégées de la lumière. Leur usage est unique. La cassette est sortie du frigo une demi-heure avant leur utilisation pour que le gel se réchauffe.

Pour que la pompe puisse être porte confortablement, toute une série d'accessoires est à la disposition du patient: sac en banane, poche, maillot de corps, sac à main.




# Pompes à gel intestinal



édition mai 22

La pompe a une durée de vie de 5 ans. Les batteries (2 piles AA) durent généralement une à deux semaines, les batteries rechargeables ne sont pas recommandées car elles perdent leur puissance rapidement.

Pour le Lecigimon il s'agit de batteries de type CR123 (disponibles en grandes surfaces) qui tiennent jusqu'à 6 mois.



Duodopa

### **Au quotidien**

Toutes les activités au quotidien sont possibles. Selon ses préférences, le patient peut assister à des manifestations culturelles, prendre part à des activités sportives ou raviver l'activité sexuelle.

**Pour prendre une douche**, un bain ou un sauna, comme la pompe n'est pas étanche, elle sera éteinte et mise de côté pour prendre un bain ou une douche, nager ou se rendre au sauna en ayant au préalable donner une dose supplémentaire. L'arrêt de la pompe peut entraîner la réapparition de symptômes et est à faire avec précaution.

**Pour les voyages**, il convient d'emporter un nombre suffisant de cassettes constamment réfrigérées, les accessoires et des médicaments par voie orales pour poursuivre le traitement en cas de problème technique. Pour les vols, un courrier du médecin traitant dans une langue adéquate indiquera que le patient est dépendant du médicament et qu'il ne s'agit pas d'un narcotique ! Rien ne s'oppose à conduire avec cette perfusion mais les patients sujets à des épisodes soudains de sommeil ou des problèmes de chute de tension orthostatique ne peuvent pas se livrer à des activités qui mettraient en danger d'autres personnes. Préparation et prévoyance sont de mises.

**Au niveau alimentaire** : Les patients traités par pompe doivent en outre renoncer aux aliments particulièrement riches en fibres comme les asperges, l'ananas, le céleri ou le poireau, car les fibres alimentaires peuvent obstruer la sortie de la sonde.

### **Accoutumance à long terme ?**

Le traitement est efficace et bien toléré pendant plusieurs années. C'est un traitement symptomatique et non curatif. Il ne ralentit pas la progression de la maladie. Aucune accoutumance n'a été observée au fil du temps. Les effets secondaires sont comparables à ceux du traitement par L-Dopa administrée par voie orale (douleur abdominale, constipation, nausée, flatulence, tension).

Le traitement peut être interrompu à tout moment. La sonde sera retirée à l'hôpital par un service neurologique. La plaie se ferme généralement très rapidement.



Duodopa



# Pompes à gel intestinal



édition mai 22

### **Urgence**

En cas de problème avec le système de sonde ou la pompe, la hotline Duodopa est accessible 24h/24 et 7j/7 : 010/84 64 80. Le service est bilingue et accessible tant pour les patients Duodopa que pour les médecins (pas pour les patients non-Duodopa donc).

Pour le Lecigimon, le même service est disponible, également 7j/7 et 24h/24. Il s'agit du service Lecigimon Care joignable par téléphone au numéro 038/70 43 93 ou par mail à l'adresse [Lecigimon@remedus.be](mailto:Lecigimon@remedus.be)

Pour pallier à tout cas d'urgence, il est recommandé que chaque patient possède à son domicile la quantité de comprimés pour pallier à une panne de courte durée (attention à la date d'expiration !).

**Parlez-en avec votre médecin.**